

**Tratamiento tópico de acción queratolítica,  
adyuvante en el tratamiento y cura de  
lesiones proliferativas de la piel.**



**Instrucciones para su uso:** Lave las lesiones y piel aledaña con una solución de jabón suave y no-irritante, enjuague con agua y seque bien.



Aplique Curaderm<sup>BCC</sup> sobre la lesión, solo lo necesario para cubrirla. No aplique la crema en cantidades excesivas y no la extienda más allá de 5 mm sobre la piel de apariencia normal que rodea a la lesión.


Aplique la crema a la lesión exprimiendo suavemente el tubo.



Cubra la lesión con un vendaje oclusivo, como esparadrapo de papel, que selle todo el perímetro; no utilice vendaje no-oclusivo. Mantenga cubierto hasta la siguiente aplicación de Curaderm<sup>BCC</sup>.

Aplique crema a la lesión al menos dos veces al día; cada doce horas como mínimo. Si el tratamiento se extiende por más de 12 semanas, por favor contacte a su médico o farmacéutico.

Una vez abierto conserve el producto en refrigerador ya que tiene una vida útil de hasta 5 años.



Obtenga su producto en [www.bioparadigm.com](http://www.bioparadigm.com)  
Representante exclusivo para la Unión Europea

Solicite código de descuento a su profesional