

ALERTA MEDICA

Importantes consideraciones para la rutina o tratamiento de emergencia

Permission for reprint courtesy of PWSA-USA

Reacciones adversas a algunos medicamentos.

Las personas con SPW pueden tener reacciones poco comunes a dosis estandarizadas de medicamentos. Extreme su precaución a la hora de dar medicamentos que puedan causar sedación; respuestas prolongadas y exageradas, nos han sido comunicadas. Vigile la función respiratoria. Puede darse una intoxicación con el agua, por el uso de algunos medicamentos con efectos antiuréticos, así como tras una ingesta exclusiva y única de líquidos.

Alto umbral del dolor.

La falta de dolor es normal, y puede enmascarar la presencia de una infección o una herida. Alguien con SPW puede que no se queje de dolor hasta que la infección sea grave, o que tenga dificultad para localizar el dolor. Las observaciones de padres o cuidadores a cerca de cambios sutiles, en su estado o comportamiento, deberán ser investigados desde un punto de vista médico.

Problemas respiratorios.

Individuos con SPW, pueden sufrir un mayor riesgo de tener dificultades respiratorias. Algunos de los factores que influyen pueden ser la hipotonía, una debilidad en los músculos pectorales y la apnea del sueño.

Alguien con un ronquido fuerte, independientemente de la edad, debería ser evaluado médicamente para descartar la apnea obstructiva del sueño. Los niños en particular, pueden tener un riesgo de fallo respiratorio debido a una enfermedad. Estudios de laboratorio, sobre la función respiratoria, pueden ser necesarios.

Falta de vómitos.

En muy raras ocasiones, las personas con SPW, vomitan. Los eméticos pueden ser poco eficaces, y repetidas dosis pueden causar toxicidad. Esta característica es de especial preocupación en relación con la hiperfagia, y la posible gestión de alimentos crudos, estropeados o de ingesta

peligrosa. La presencia de vómitos puede ser una señal de una enfermedad que pueda comprometer la vida.

Úlcera gástrica.

La distensión abdominal, dolor y vómitos, pueden ser signos de inflamación gástrica, que compromete a la vida o necrosis. Más común en individuos con SPW que en el resto de la población. Mas que un dolor localizados, lo que puede haber es un sentimiento de malestar. Si un individuo PW tiene estos síntomas, es necesario una observación cercana. Una radiografía y una endoscopia con biopsia, pueden ser necesarias para determinar el grado de problema, y la posible necesidad de una intervención inmediata.

Distorsiones en la temperatura corporal.

Puede darse hiper o hipotermia idiopáticas. La hipertermia puede ocurrir en enfermedades leves, o en procedimientos que requieran anestesia. Una infección grave en estos casos, puede cursar sin fiebre.

Lesiones en la piel y contusiones.

Debido al comportamiento de estas personas, son frecuentes las lesiones en la piel a causa del rascado. También tienden a tener moratones y contusiones fácilmente. La presencia de estas heridas y estas contusiones, puede llevarnos erróneamente a sospechar de malos tratos físicos.

Hiperfagia (apetito excesivo).

El apetito insaciable puede desencadenar una ganancia de peso que llegue a comprometer la vida, esto puede suceder de forma muy rápida, incluso llevando una dieta baja en calorías.

Edema.

Las personas con SPW pueden tener edemas que pasen desapercibidos. Será necesario un cuidadoso examen clínico, así como diurético.